

Laguna Chlor šok /

PŘÍPRAVEK K RYCHLÉ DEZINFEKCI VODY

PRÍPRAVOK NA RÝCHLU DEZINFEKCIU VODY



VÝHODY

- rychlá šoková dezinfekcia vody
- likviduje riasy a baktérie
- poradí si so silným znečistením
- vysoká výdatnosť

POUŽITIE

Dezinfekčný (biocídny) prípravok na celosezónnu údržbu všetkých typov bazénov predovšetkým na jednorazovú, teda „šokovú“ úpravu bazénovej vody po napustení alebo pri silnom znečistení. Likviduje riasy a baktérie.

UPOZORNENIE

Pred použitím prípravku treba upraviť pH vody v bazéne na 6,8–7,6. Do doby, než dôjde k dokonalému premiešaniu prípravku s vodou pomocou filtračného zariadenia, treba vylúčiť prítomnosť osôb v bazéne! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Nedotýkajte sa prípravku mokрыmi rukami.

APLIKÁCIA

Po napustení bazéna vodou najskôr upravte hodnotu pH na 6,8–7,6. Následne nalejte počiatočnú dávku prípravku (granulátu rozpusteného vo vode v plastovej nádobe) do zberača (skimmera) alebo priamo do bazéna pri zapnutom filtračnom zariadení. Do doby dokonalého premiešania prípravku filtračným zariadením je nutné vylúčiť prítomnosť osôb v bazéne! Chlórovanie sa odporúča vykonávať večer. Nasledujúci deň aplikujte chlórové tablety Laguna. Pri pravidelnej prevádzke pridávajte štandardnú (priebežnú) dávku Laguny Chlór šok. Pri zvýšenej prevádzke, vyššej teplote alebo pri probléme s riasami aplikujte zvýšenú dávku. Je nutné udržiavať obsah aktívneho chlóru v rozmedzí 0,3–0,8 mg/l a pH 6,8–7,6. Pri zvýšenej teplote vody je možné krátkodobo zvýšiť obsah aktívneho chlóru až na 1,0 mg/l. Obsah chlóru a hodnotu pH kontrolujte 1× týždenne pomocou testerov (Laguna tester 4v1 alebo Laguna tester pH/chlór).

SPÔSOB APLIKÁCIE

Rozpustenie granulátu vo vode v plastovej nádobe a naliatie do zberača (skimmera) alebo priamo do bazénovej vody.

VÝDATNOSŤ

Až 200 m³/ kg

DÁVKOVANIE

Počiatočná dávka: 10 g prípravku (1 rovná polievková lyžica) na 1 m³ (1 000 l) vody.
Priebežná dávka: cca 5 g/m³ každých 4–6 dní.
Zvýšená dávka: 8 až 12 g/m³.

Použitím 1,8 g prípravku na 10 m³ vody sa zvýši obsah aktív. chlóru o cca 0,1 mg/l.

ZLOŽENIE

Dichlorizokyanurát sodný, dihydrát.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



ISO 9001 ISO 14001

www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

Laguna Chlor šok /

PŘÍPRAVEK K RYCHLÉ DEZINFEKCI VODY

PRÍPRAVOK NA RÝCHLU DEZINFEKCIU VODY

PARAMETRE PRÍPRAVKU

Vzhľad	biele až svetlo šedé granule
Zápach	charakteristický zápach po chlóre
Relatívna hustota	1,97
pH (1% vodný roztok, 20 °C)	6,0–6,7
Bod topenia/tuhnutia	240–250 °C
Horľavosť	nehorľavý (podporuje horenie)
Bod vzplanutia	> 250 °C (dichlorizokyanurát sodný)
Teplota rozkladu	> 225 °C (dichlorizokyanurát sodný)
Rozpustnosť vo vode	~ 250 g/l (dichlorizokyanurát sodný)

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladovať a prepravovať v originálnych dokonale uzavretých obaloch pri teplote od 5 °C do 30 °C, v suchých a dobre vetraných priestoroch, oddelene od potravín, nápojov a krmív. Neskladovať v blízkosti predmetov náchylných na koróziu.

EXSPIRÁCIA

Do dátumu uvedeného na obale pri dodržaní podmienok skladovania.

ODPORÚČANIE VÝROBCU

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

1 kg; 2,5 kg; 9 kg

Dátum revízie:

15.5.2025 (Predošlé vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz



www.stachema.sk

Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk

ISO 9001 ISO 14001